

SUR L'ANNEAU DE COHOMOLOGIE DU SCHÉMA DE HILBERT DE $\mathbb{C}^2$

E. VASSEROT

RÉSUMÉ. Nous exprimons le produit de l'anneau de cohomologie du schéma de Hilbert en fonction du produit de l'algèbre du groupe symétrique. Cette construction est différente de celle de [9, §4.4] où le produit s'interprète en termes d'opérateurs différentiels. Nous donnons une conjecture pour le cas des résolutions crépantes de singularités quotient symplectiques.

RÉSUMÉ (VERSION ANGLAISE). We express the product of the cohomology ring of the Hilbert scheme in terms of the center of the algebra of the symmetric group. We give a conjecture for the case of crepant resolutions of symplectic quotient singularities.

A. RAPPELS ET NOTATIONS.

A.1. Pour tout entier positif n , soit X_n le schéma de Hilbert des sous-schémas de longueur n de $\mathbb{C}^2 = \text{Spec } \mathbb{C}[x, y]$. On pose $X_0 = \{\textit{point}\}$. Considérons les courbes $\Sigma = \{x = 0\}$, $\Sigma' = \{y = 0\} \subset \mathbb{C}^2$. Soit $Y_n \subset X_n$ le sous-ensemble des schémas supportés par la courbe Σ . L'action du groupe $\mathbb{C}^\times$ sur $\mathbb{C}^2$ telle que $t \cdot (x, y) = (tx, t^{-1}y)$ induit une action de $\mathbb{C}^\times$ sur X_n , notée $\circ$. Les points fixes de cette action correspondent aux idéaux homogènes de $\mathbb{C}[x, y]$. Ils sont paramétrés par l'ensemble Π_n des partitions de l'entier n . Soit $\xi_\lambda \in X_n$ le point fixe associé à la partition λ . Soit $h(s)$ la longueur d'équerre de la case s du diagramme de la partition λ . Notons $h(\lambda) = \prod_{s \in \lambda} h(s)$, et notons $l(\lambda)$ le nombre de parts de la partition λ .

A.2. Soit X une variété algébrique munie d'une action du groupe $\mathbb{C}^\times$. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, soient $H_{\mathbb{C}^\times}^k(X)$ et $H_{\mathbb{C}^\times}^{\mathbb{C}^\times}(X)$ les k -èmes groupes de cohomologie et d'homologie équivariantes à coefficients complexes. Nous utilisons les notations de [7, §1], [8, §1] pour l'homologie et la cohomologie équivariante, i.e.

$$H_{\mathbb{C}^\times}^k(X) = H_{\mathbb{C}^\times}^k(X, \mathbb{C}_X), \quad H_{\mathbb{C}^\times}^{\mathbb{C}^\times}(X) = H_{\mathbb{C}^\times}^{k-2 \dim X}(X, \mathbb{D}_X),$$

où $\mathbb{D}_X$ est le dual de Verdier du faisceau constant $\mathbb{C}_X$ (voir [8, §1.13]). Les foncteurs $f^*, f_!$ sont définis dans [7, §1.4]. Les applications linéaires [8, 1.18.(d),(e)] sont notées respectivement

$$\cup : H_{\mathbb{C}^\times}^i(X) \otimes H_{\mathbb{C}^\times}^j(X) \rightarrow H_{\mathbb{C}^\times}^{i+j}(X), \quad \cap : H_{\mathbb{C}^\times}^i(X) \otimes H_{\mathbb{C}^\times}^{\mathbb{C}^\times}(X) \rightarrow H_{i+j}^{\mathbb{C}^\times}(X).$$

Recherche partiellement financée par le programme européen no. ERB FMRX-CT97-0100.

Rappelons que les anneaux gradués $H_{\mathbb{C}^\times}^*(point)$ et $\mathbb{C}[t]$ (où t est un élément de degré 2) sont isomorphes, ainsi que les $\mathbb{C}[t]$ -modules gradués $H_*^{\mathbb{C}^\times}(point)$ et $\mathbb{C}[t]$. En particulier, $H_{\mathbb{C}^\times}^*(X)$ est une $\mathbb{C}[t]$ -algèbre graduée unitaire, et $H_*^{\mathbb{C}^\times}(X)$ est un $\mathbb{C}[t]$ -module gradué. Si X est une variété équidimensionnelle il y a une application $\mathbb{C}[t]$ -linéaire $D : H_{\mathbb{C}^\times}^k(X) \rightarrow H_k^{\mathbb{C}^\times}(X)$, qui est inversible si X est lisse. Donc si X est lisse on obtient un produit d'intersection

$$\cap : H_i^{\mathbb{C}^\times}(X) \otimes H_j^{\mathbb{C}^\times}(X) \rightarrow H_{i+j}^{\mathbb{C}^\times}(X).$$

Si $i : Y \hookrightarrow X$ est le plongement d'une sous-variété fermée de codimension k stable par l'action du groupe $\mathbb{C}^\times$, posons $[Y] = i_* D(1_Y) \in H_{2k}^{\mathbb{C}^\times}(X)$, où $1_Y \in H_{\mathbb{C}^\times}^0(Y)$ est l'élément unité de l'algèbre $H_{\mathbb{C}^\times}^*(Y)$.

A.3. Soit $A_k^{\mathbb{C}^\times}(X)$ le k -ème groupe de Chow équivariant de la $\mathbb{C}^\times$ -variété X (voir [3]). L'application cycle est un morphisme de foncteurs $cl : A_k^{\mathbb{C}^\times} \rightarrow H_{2\dim X - 2k}^{\mathbb{C}^\times}$ (voir [3, §2.8], [8, §1.17]) qui commute au produit d'intersection $\cap$, quand il est défini. A une sous-variété fermée $Y \subseteq X$ stable par l'action du groupe $\mathbb{C}^\times$ on associe sa classe fondamentale $[Y]$ dans $A_*^{\mathbb{C}^\times}(X)$ (voir [3, §2.2]). Par construction $cl([Y]) = [Y]$. Les propriétés usuelles du produit d'intersection s'étendent à l'homologie équivariante. Par exemple, si $Y_1, Y_2 \subseteq X$ sont des sous-variétés fermées stables par l'action de $\mathbb{C}^\times$ qui sont lisses et transverses au voisinage de l'intersection $Y_1 \cap Y_2$, alors $[Y_1] \cap [Y_2] = [Y_1 \cap Y_2]$ dans $H_*^{\mathbb{C}^\times}(X)$.

A.4. Pour toute partition λ soit λ^i la multiplicité de i dans λ . On pose $\lambda^0 = \infty$. On note $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ les parts de λ ordonnées en une suite décroissante. Soit $\Sigma^{(\lambda)}$ l'adhérence de Zariski du sous-ensemble $\{\sum_i \lambda_i [x_i] \mid x_i \in \Sigma, x_i \neq x_j \text{ si } i \neq j\}$ de X_n . Posons

$$Y_\lambda = \{\xi \in X_n \mid \lim_{t \rightarrow \infty} t \diamond \xi \in \Sigma^{(\lambda)}\}, \quad X_\lambda = \{\xi \in X_n \mid \lim_{t \rightarrow 0} t \diamond \xi \in \Sigma^{(\lambda)}\},$$

où $\diamond$ est l'action de $\mathbb{C}^\times$ sur X_n induite par l'action de $\mathbb{C}^\times$ sur $\mathbb{C}^2$ telle que $t \diamond (x, y) = (tx, y)$. Notons θ le $\mathbb{C}^\times$ -module de dimension 1 tel que $z \in \mathbb{C}^\times$ agit par multiplication par z .

Proposition A. (i) On a $X_n = \bigsqcup_\lambda X_\lambda$ et $Y_n = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$. Les sous-ensembles X_λ, Y_λ sont stables par l'action $\circ$ du groupe $\mathbb{C}^\times$. On a $Y_\lambda \simeq \mathbb{C}^n$ et $X_\lambda \simeq \mathbb{C}^{n+l(\lambda)}$. De plus ξ_λ est un point régulier de X_λ et Y_λ . Enfin, $Y_\mu \subseteq \bar{Y}_\lambda$ si et seulement si $\lambda \geq \mu$. (ii) L'espace tangent $T_{\xi_\lambda} X_n$ est isomorphe au $\mathbb{C}^\times$ -module $\bigoplus_{s \in \lambda} (\theta^{h(s)} \oplus \theta^{-h(s)})$, et $T_{\xi_\lambda} Y_\lambda$ est isomorphe à $\bigoplus_{s \in \lambda} \theta^{-h(s)}$.

Preuve. Voir [4] et [10] par exemple. □

B. COHOMOLOGIE ÉQUIVARIANTE DE X_n

B.1. Soit S_n le groupe symétrique, et soit $S_\lambda \subseteq S_n$ le sous-groupe de Young associé à la partition λ . Soit Z_n le centre de l'algèbre $\mathbb{C}[S_n]$. Notons $s_\lambda, c_\lambda, h_\lambda \in Z_n$ le caractère du module simple associé à la partition λ , la classe de conjugaison associée à λ et le caractère du module induit $\mathbb{C}[S_n]/\mathbb{C}[S_\lambda]$. Soit $(m_\lambda; \lambda \in \Pi_n)$ la base duale de $(h_\lambda; \lambda \in \Pi_n)$ pour le produit scalaire sur Z_n tel que $(s_\lambda | s_\mu) = \delta_{\lambda\mu}$. Soit $\Pi(\lambda, i)$ l'ensemble des partitions μ de $n + i$ telles que

$$(B.2) \quad \exists k \in [0, n] \quad \text{tel que} \quad \mu^k = \lambda^k - 1, \quad \mu^{i+k} = \lambda^{i+k} + 1,$$

pour un certain entier k . Si μ et k satisfont (B.2), posons $a_{\lambda\mu} = \mu^{i+k}$. Soient $\odot : Z_m \otimes Z_n \rightarrow Z_{m+n}$ et $\bullet : Z_n \otimes Z_n \rightarrow Z_n$ les applications bilinéaires induites par l'induction des représentations du groupe symétrique et le produit de l'algèbre $\mathbb{C}[S_n]$. On sait que

$$(B.3) \quad c_{(i)} \odot m_\lambda = \sum_{\mu \in \Pi(\lambda, i)} a_{\lambda\mu} m_\mu, \quad s_\lambda \bullet s_\mu = \delta_{\lambda\mu} h(\lambda) s_\lambda.$$

B.4. Dorénavant, $H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)$ et $H_*^{\mathbb{C}^\times}(X_n)$ sont les groupes de cohomologie et d'homologie équivariante relatifs à l'action $\circ$. Si $i > 0$ soit $X_{n,i}, X'_{n,i}$ les ensembles de couples $(\xi, \xi') \in X_n \times X_{n+i}$ tels que $\xi \subseteq \xi'$, et le support de $\xi' - \xi$ est un point (de multiplicité i) de Σ, Σ' . Les ensembles $X_{n,i}, X'_{n,i}$ sont des sous-variétés fermées de $X_n \times X_{n+i}$ de dimension $2n + i$ (voir [5, (8.11)]). Soit π_1, π_2 les projections de $X_n \times X_{n+i}$ sur chacun des facteurs. Le produit de convolution par $[X_{n,i}]$ est l'opérateur $\mathbb{C}[t]$ -linéaire

$$P_i : H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n) \rightarrow H_{\mathbb{C}^\times}^{*+2i}(X_{n+i}), \quad \alpha \mapsto D^{-1}\pi_{2!}((\pi_1^*\alpha) \cap [X_{n,i}])$$

(la restriction de π_2 à la sous-variété $X_{n,i}$ est propre). Le produit de convolution par $[X'_{n,i}]$, noté P'_i , est défini de la même façon. On a $[\Sigma'] = -[\Sigma]$ dans $H_*^{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{C}^2)$. Donc $P'_i = -P_i$. Posons $p_\lambda = P_1^{\lambda^1} P_2^{\lambda^2} \cdots (1_{X_0}) \in H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$. Soit $\mathbb{C}[t]'$ l'anneau local de $\mathbb{C}[t]$ en l'idéal $(t-1)$. Pour tout $\mathbb{C}[t]$ -module M , notons $M' = \mathbb{C}[t]' \otimes_{\mathbb{C}[t]} M$. D'après le théorème de localisation en homologie équivariante, l'image directe

$$\iota_n! : H_*^{\mathbb{C}^\times}(X_n^{\mathbb{C}^\times})' \rightarrow H_*^{\mathbb{C}^\times}(X_n)'$$

par le plongement fermé $\iota_n : X_n^{\mathbb{C}^\times} \hookrightarrow X_n$ est inversible (voir [8, Proposition 4.4]). Soit $(|)$ la forme bilinéaire

$$H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)' \otimes_{\mathbb{C}[t]'} H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)' \rightarrow \mathbb{C}[t]', \quad (\alpha | \beta) = (-1)^n p_n! (\iota_n!)^{-1} D(\alpha \cup \beta),$$

où p_n est la projection de $X_n^{\mathbb{C}^\times}$ sur un point. Soit

$$P_i^* : H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)' \rightarrow H_{\mathbb{C}^\times}^{*-2i}(X_{n-i})'$$

l'adjoint de l'opérateur P_i . Il est facile de voir que

$$P_i^*(\alpha) = D^{-1}\pi_{1!}'(id \times \iota_n)!^{-1}((\pi_2^*\alpha) \cap [X_{n-i,i}]),$$

où π_1' est la projection $X_{n-i} \times X_n^{\mathbb{C}^\times} \rightarrow X_{n-i}$. Pour toute partition $\lambda \in \Pi_n$ posons $y_\lambda = D^{-1}([\bar{Y}_\lambda]) \in H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)'$.

Lemme 1. (i) On a

$$[P_i, P_j] = [P_i^*, P_j^*] = 0, \quad [P_i, P_j^*] = \delta_{i,j} i(-1)^{i-1} id.$$

(ii) La famille $(y_\lambda; \lambda \in \Pi_n)$ est une base de $H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$ sur $\mathbb{C}$.

(iii) Il y a un isomorphisme de $\mathbb{C}[t]'$ -modules $\psi : H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)' \rightarrow \mathbb{C}[t]' \otimes Z_n$, tel que $\psi(p_\lambda) = c_\lambda$ et $\psi(y_\lambda) = m_\lambda$.

Preuve. Un calcul identique à celui de [5, §8.4] donne

$$[P_i, P_j] = [P_i^*, P_j^*] = 0, \quad [P_i, P_j^*] = \delta_{i,j} \kappa_i id,$$

où $\kappa_i \in \mathbb{C}$. D'autre part, les sous-variétés $X_{n,i}$, $\pi_1^{-1}(\bar{Y}_\lambda)$ sont transverses (voir la preuve du théorème [4, Theorem 4.6]), et l'intersection $\pi_1^{-1}(\bar{Y}_\lambda) \cap X_{n,i}$ est la réunion de sous-variétés fermées Z_μ , $\mu \in \Pi(\lambda, i)$, qui sont stables par l'action du groupe $\mathbb{C}^\times$ et telles que la restriction de π_2 à Z_μ est génériquement un revêtement de $\bar{Y}_\mu$ de degré $a_{\lambda\mu}$. Donc

$$(B.5) \quad P_i(y_\lambda) = \sum_{\mu \in \Pi(\lambda, i)} a_{\lambda\mu} y_\mu.$$

Enfin, on a $(P_i')^*([\Sigma^{(n)}]) = [\Sigma^{(n-i)}]$ puisque Σ et Σ' sont transverses (voir [5, Lemma 9.21]). Donc le calcul de κ_i est le même que dans [5, §9.3]. La famille $(y_\lambda; \lambda \in \Pi_n)$ est une base de $H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)'$ sur $\mathbb{C}[t]'$, d'après le théorème de localisation et la proposition A. Considérons l'isomorphisme de $\mathbb{C}[t]'$ -modules

$$\psi : H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)' \rightarrow \mathbb{C}[t]' \otimes Z_n, \quad y_\lambda \mapsto m_\lambda.$$

Alors, $\psi(p_\lambda) = c_\lambda$ d'après (B.5) et (B.3). □

B.6. D'après la proposition A, on a

$$H_k^{\mathbb{C}^\times}(X_n) = \bigoplus_{2n-2l(\lambda)+2j=k} \mathbb{C} t^j \cap [\bar{X}_\lambda].$$

Donc $H_{\mathbb{C}^\times}^{4n}(X_n) = t^n \cup H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$. L'application

$$\star : H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n) \otimes H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n) \rightarrow H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$$

telles que $t^n \cup (x \star y) = x \cup y$, munit $H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$ d'une structure d'algèbre sur $\mathbb{C}$. Soit $[\lambda] \in H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$ l'élément tel que

$$t^n \cup [\lambda] = (-1)^n h(\lambda)^{-1} D^{-1}([\xi_\lambda]).$$

Lemme 2. On a

- (i) $([\lambda] | [\mu]) = \delta_{\lambda\mu}$,
- (ii) $[\lambda] \in y_\lambda + \bigoplus_{\mu > \lambda} \mathbb{C} y_\mu$,
- (iii) $(p_\lambda | p_\mu) = \delta_{\lambda\mu} z_\lambda$, où $z_\lambda = \prod_i (i^{\lambda^i} \lambda^i!)$,

Preuve. Si X, Y sont des $\mathbb{C}^\times$ -variétés équidimensionnelles telles que $Y \subseteq X$ est fermée et $X^{\mathbb{C}^\times}$ est fini, alors

$$(B.7) \quad [Y] = \sum_{y \in Y^{\mathbb{C}^\times}} c_y(Y) t^{-\dim Y} \cup [x] \in H_*^{\mathbb{C}^\times}(X)',$$

où les constantes $c_y(Y) \in \mathbb{Q}$ sont telles que si y est un point régulier de Y alors $c_y(Y) \neq 0$, $c_y(Y)^{-1} \in \mathbb{Z}$ et $\theta^{1/c_y(Y)} \simeq \bigwedge^{\max} T_y^* Y$ (voir A.3 et [2, §4]). L'égalité (i) est immédiate d'après la formule de projection et la proposition A. Plus précisément, si ι_λ le plongement de $\{\xi_\lambda\}$ dans X_n , alors

$$\begin{aligned} (D^{-1}[\xi_\lambda] | D^{-1}[\xi_\mu]) &= (-1)^n p_n! \iota_n!^{-1} ([\xi_\lambda] \cap [\xi_\mu]) \\ &= \delta_{\lambda\mu} (-1)^n p_n! D \iota_\lambda^* D^{-1} \iota_\lambda! (1) \\ &= \delta_{\lambda\mu} (-1)^n c_{\xi_\lambda}(X_n)^{-1} t^{2n} \\ &= \delta_{\lambda\mu} t^{2n} h(\lambda)^2, \end{aligned}$$

où la troisième égalité est une conséquence de [7, §1.10], et la quatrième une conséquence de la proposition A. La formule (ii) découle de (B.7) et de la proposition A. L'égalité (iii) se démontre comme dans [4]. En effet, si $n \geq i$,

$$(P_i(p_\lambda) | p_\mu) = (p_\lambda | P_i^*(p_\mu)) = i\mu^i (p_\lambda | p_{\mu'})$$

d'après le lemme 1, où la partition $\mu' \in \Pi_{n-i}$ est telle que $\mu'^j = \mu^j - \delta_{i,j}$ pour tout j . On conclut par récurrence sur $l(\lambda)$. $\square$

Proposition B. (i) *Il existe un unique isomorphisme d'espaces vectoriels $\phi : H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n) \rightarrow Z_n$, tel que $\phi([\lambda]) = s_\lambda$ et $\phi(p_\lambda) = c_\lambda$.*

(ii) *L'application ϕ est un morphisme d'algèbres.*

Preuve. D'après les lemmes 1 et 2 on a $\psi([\lambda]) = s_\lambda$. Donc, la restriction ϕ de ψ au sous-espace $H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n) \subset H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)'$ satisfait (i). D'après la proposition A et la formule de projection on a,

$$D^{-1}[\xi_\lambda] \cup D^{-1}[\xi_\mu] = (-1)^n \delta_{\lambda\mu} h(\lambda)^2 t^{2n} \cup D^{-1}[\xi_\lambda].$$

Donc $\phi([\lambda] \star [\mu]) = \phi([\lambda]) \bullet \phi([\mu])$ d'après (B.3). $\square$

C. THÉORÈME ET CONJECTURE

C.1. Considérons les filtrations croissantes sur $H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$ et Z_n telles que

$$E_p = \bigoplus_{k \leq p} t^{n-k} \cup H_{\mathbb{C}^\times}^{2k}(X_n), \quad F_p = \bigoplus_{n-l(\lambda) \leq p} \mathbb{C} c_\lambda, \quad p \in [0, n].$$

Ces filtrations sont compatibles avec $\star$ et $\bullet$ (voir [6, §3.8] dans le cas de Z_n). Les anneaux gradués associés sont notés Gr_*^E et Gr_*^F .

Théorème. *Les anneaux gradués $H^*(X_n)$ et Gr_{2*}^F sont isomorphes.*

Preuve. La famille $(p_\lambda; \lambda \in \Pi_n)$ est une base de $H_{\mathbb{C}^\times}^{2n}(X_n)$ sur $\mathbb{C}$. D'autre part $p_\lambda \in t^{l(\lambda)} \cup H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)$ car $[\Sigma] = t \cup [\mathbb{C}^2]$. D'après la proposition B on a donc $\phi(E_p) = F_p$. Les anneaux gradués Gr_*^E et Gr_*^F sont donc isomorphes. La suite spectrale de Leray

$$E_2^{p,q} = H^p(BS^1) \otimes H^q(X_n) \Rightarrow H_{\mathbb{C}^\times}^{p+q}(X_n)$$

dégénère en E_2 , puisque les groupes cohomologie de degré impair de X_n sont nuls. Donc les anneaux gradués $\mathbb{C}[t] \otimes H^*(X_n)$ et

$$\bigoplus_{p \geq 0} t^p \cup H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n) / t^{p+1} \cup H_{\mathbb{C}^\times}^*(X_n)$$

sont isomorphes. En particulier on a $\text{Gr}_*^E \simeq H^*(X_n)$. $\square$

C.2. Plus généralement, si $G \subset Sp_{2n}(\mathbb{C})$ est un sous-groupe fini et $g \in G$, soit $w(g)$ le rang de l'opérateur $g - id_{\mathbb{C}^{2n}}$. On a $w(gh) \leq w(g) + w(h)$ pour tout g, h (voir [6, §3.8]). Considérons la filtration croissante du centre de l'algèbre $\mathbb{C}[G]$ telle que F_p est linéairement engendré par les classes de conjugaison d'éléments $g \in G$ tels que $w(g) \leq p$.

Conjecture. *Si $M \rightarrow \mathbb{C}^{2n}/G$ est une résolution crépante, les anneaux gradués $H^*(M)$ et Gr_*^F sont isomorphes.* $\square$

Remarque. D'après [1, Theorem 8.4] on sait que $\dim H^k(M) = \dim Gr_k^F$, puisque $w(g)$ est le double de l'âge de g .

Remerciements. Je remercie V. Ginzburg qui a suggéré l'énoncé du théorème.

REFERENCES

- [1] Batyrev, V., *Non-Archimedean integrals and stringy Euler numbers of log-terminal pairs*, J. Eur. Math. Soc. **1** (1999), 5-33.
- [2] Brion, M., *Equivariant Chow groups for torus actions*, Journal of Transformation groups **2** (1997), 225-267.
- [3] Edidin, D., Graham, W., *Equivariant intersection theory*, Inv. Math. **131** (1998), 595-634.
- [4] Nakajima, H., *Jack polynomials and Hilbert schemes of points on surfaces*, preprint **alg-geom9610021**.
- [5] Nakajima, H., *Lectures on Hilbert schemes of points on surfaces*, University Lecture Series 18, American Mathematical Society, Providence, 1999.
- [6] Suarez Alvarez, M., *Algebra structure on the Hochschild cohomology of the ring of invariants of a Weyl algebra under a finite group*, preprint (2000).
- [7] Lusztig, G., *Cuspidal local systems and graded Hecke algebras, I*, Publ. Math., Inst. Hautes Etud. Sci. **67** (1988), 145-202.
- [8] Lusztig, G., *Cuspidal local systems and graded Hecke algebras, II*, Representations of groups, CMS Conf. Proc. 16, American Mathematical Society, Providence, 1995, pp. 217-275.
- [9] Lehn, M., *Chern classes of tautological sheaves on Hilbert schemes of points on surfaces*, Inv. Math. **136** (1999), 157-207.
- [10] Valli, G., *Bi-invariant Grassmannians and Atiyah-Jones theorems*, Topology **39** (2000), 1-31.

Eric Vasserot
 Département de Mathématiques
 Université de Cergy-Pontoise
 2 Av. A. Chauvin
 95302 Cergy-Pontoise Cedex
 France
 email: eric.vasserot@u-cergy.fr